Atelier 2 : Pansements au charbon

Europharmat 2010

Toulouse

Composition / Description

Les pansements à base de charbon actif sont des pansements constitués de différents supports auxquels a été ajouté du charbon actif, à visée d'absorption des molécules responsables des mauvaises odeurs des plaies. Ils se présentent sous forme de plaques et de compresses.*

Certains pansements au charbon contiennent des ions argent et sont destinés à la prise en charge des plaies infectées.

*Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des articles pour pansements inscrits à la section 1, chapitre 3, titre 1er, de la liste prévue à l'article L.165-1 (LPP) du code de la Sécurité Sociale

Propriétés / Mode d'action

Les pansements au charbon actif permettent :

- d'absorber les odeurs
- d'adsorber et de fixer les bactéries
- d'absorber les exsudats (plus ou moins selon la composition du pansement)

Les pansements au charbon actif sont non adhérents.



Indications / Contre-indications

Indications :
Plaies aiguës ou chroniques malodorantes, plus ou moins exsudatives, infectées ou non
Peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire

La prise en charge est assurée pour les plaies malodorantes.*

Contre-indication : sensibilité connue à l'un des composants
Effet indésirable : rares cas d'irritation / de macération de la peau péri-lésionnelle

*Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à la modification de la procédure d'inscription et des conditions de prise en charge des articles pour pansements inscrits à la section 1, chapitre 3, titre 1er, de la liste prévue à l'article L.165-1 (LPP) du code de la Sécurité Sociale

Mode d'emploi et précautions d'emploi

1. Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, puis rincer avec de l'eau ou du sérum physiologique
2. Bien sécher le pourtour de la plaie par tamponnement
3. Réaliser éventuellement une détersion mécanique de la plaie
4. Appliquer le pansement sur la plaie ou sur le pansement primaire en dépassant de 2 à 3 centimètres
5. Si besoin ajouter un pansement absorbant
6. Recouvrir d'un système de maintien (bande, film PU…)
7. Fréquence de changement : tous les 2 à 3 jours ou plus fréquemment selon l'importance des exsudats et des odeurs. Changement quotidien préconisé en cas de plaie infectée.

En cas de plaie peu ou pas exsudative, possibilité d'appliquer sur la plaie un pansement gras ou une interface
Découpage possible selon les recommandations du fabricant

Source : Fiche Bon usage Europharmat, mise à jour du 8 juin 2010

Panorama du marché

Actisorb™ Ag +	*Systagenix*
Askina® Carbosorb	*B Braun medical*
Carboflex®	*Convatec*
Carbonet®	*Smith & Nephew*
Vliwaktiv® / Vliwaktiv® Ag	*Lohmann & Rauscher*